

TATTOO PIERCING

**KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 NOVEMBER 2005**  
BETREFFENDE DE REGLEMENTERING  
**VAN DE TATOEAGES EN PIERCINGS**



**Tatoeages** en **piercings** die worden uitgevoerd in slechte omstandigheden houden een risico voor de gezondheid in. Men merkt volgende risico's op:

- bacteriële infecties, met name huidinfecties of kraakbeeninfecties (bijvoorbeeld door de staphylococcus aureus), tetanus,...;
- virale infecties, met name hepatitis of aids,...;
- allergische reacties, met name op bestanddelen van de inkt, kleurstof en de ingebrachte voorwerpen.

Alvorens over te gaan tot een **piercing** of **tatoeage**, worden volgende personen verzocht een arts te raadplegen:

- die lijden aan hemofilie, een storing in de bloedstolling, of die geneesmiddelen nemen die kunnen interfereren met de bloedstolling of vorming van bloedklonters;
- die lijden aan een verminderd immunitair systeem of herhaalde infectie;
- die lijden aan een allergie;
- die lijden aan een huidaandoening;
- die lijden aan een hartkwaal;
- zwangere vrouwen.

**Tatoeages** en **piercings** zijn duurzaam en zelfs permanent en onomkeerbaar. U kunt voor de verrichting steeds bedenktijd vragen.

**Tatoeages** en **piercings** moeten worden verricht in strikte hygiënische omstandigheden. U kunt er zich van vergewissen dat de beroepsbeoefenaar wegwerphandschoenen gebruikt nadat hij zijn handen heeft gewassen en dat hij een nieuwe nog ingepakte naald gebruikt. De beroepsbeoefenaar moet een lijst met de na te leven aanbevelingen inzake hygiëne ter uwer beschikking stellen. Voordat u bloed geeft, moet u verklaren dat u een piercing of tatoeage ondergaan heeft, zelfs wanneer het siervoerwerp is verwijderd. U kan gedurende een bepaalde periode als bloeddonor geweigerd worden.

**Tatoeages** en **piercings** mogen niet worden verricht op personen die onder invloed zijn van alcohol, drugs, geneesmiddelen die hun beslissingsvermogen beïnvloeden of meer algemeen, die niet over hun beslissingsvermogen beschikken.

In het geval van een infectie, allergie of andere symptomen die na de verrichting opkomen, wordt er aangeraden een arts te raadplegen.